

Tárgyak:	Kiszáradó láprét a Tapolcai-medencében
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_2106

Leírás

Kiszáradó láprét a Tapolcai-medencében, háttérben a Keszthelyi-hegység keleti letörésével.

A Tapolcai-medence - a déli berkekhez és a Kis-Balaton körzetéhez hasonlóan - a Balaton egykori ártere, öntésterülete volt. A part beépítéséhez le kellett csapolni a területet, így a vízállásos rétek, nádasok vízi világa szárazra került, többségében mesterséges csatornák lettek kiépítve, amin keresztül jutnak a terület vízfolyásai és az ide hulló csapadék a Balatonba. A Tapolcai-medencének csak egy kis része számít már csak természetközeli állapotúnak, de még ezek is kimagaslóan értékes, vízigényes növényvilágot tartanak fenn. Ennek a területnek egy szegletében él a Balaton-felvidéki Nemzeti Park korábbi címernövénye, a fokozottan védett lisztes kankalin két megmaradt állományának az egyike.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

300 dpi, 3648 x 2736 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2016. április 15.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Nemesvita

Kulcsszavak

- Tájak, élőhelyek