

	<b>Object:</b> Vízparti deréce - <i>Epilobium dodonaei</i> 2
	<b>Museum:</b> Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
	<b>Collection:</b> RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
	<b>Inventory number:</b> RRM_TT_DF_2250

## Description

A deréce-növényfajok pionír fajok, ami azt jelenti, hogy az elsők között képesek egy újonnan kialakult élőhelyet benépesíteni. A legtöbbször nyílt talaj- vagy sziklafelszíneken hozzák létre más növényfajok előtt állományaikat.

A vízparti deréce eredetileg nagyobb folyók kavicszátonyain volt elterjedt elsősorban, de mára sokkal jelentősebb állományai alakultak ki a külszín bányák felhagyott sziklaoldalain. Még az őshonossága is kérdéses, mert jelenleg alig van folyózátonyi állománya Magyarországon, bányafelszíni viszont jó néhány. Előfordul a Szigetközben kavicszátonyokon, valamint középhegységi külszíni bányafalakon, de összességében ritka fajnak számít. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

## Basic data

Material/Technique:	Digitális
Measurements:	300 dpi, 3648 x 2736 pixel, jpg

## Events

Image taken	When	August 14, 2016
	Who	Schmidt Péter
	Where	Kőszárhegy

## Keywords

- kétszikűek
- védett faj