

Tárgyak:	Vízparti deréce - <i>Epilobium dodonaei</i> 3
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_2251

Leírás

A deréce-növényfajok pionír fajok, ami azt jelenti, hogy az elsők között képesek egy újonnan kialakult élőhelyet benépesíteni. A legtöbbször nyílt talaj- vagy sziklafelszíneken hozzák létre más növényfajok előtt állományukat.

A vízparti deréce eredetileg nagyobb folyók kavicszátonyain volt elterjedt elsősorban, de mára sokkal jelentősebb állományai alakultak ki a külszín bányák felhagyott sziklaoldalain. Még az őshonossága is kérdéses, mert jelenleg alig van folyózátonyi állománya Magyarországon, bányafelszíni viszont jó néhány. Előfordul a Szigetközben kavicszátonyokon, valamint középhegységi külszíni bányafalakon, de összességében ritka fajnak számít. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Alapadatok

Anyag/ Technika:	Digitális
Méret:	350 dpi, 3648 x 2738 pixel, jpg

Események

Felvétel készítése	mikor	2020. augusztus 18.
	ki	Schmidt Péter
	hol	Mecsek
Felvétel készítése	mikor	2020. augusztus 18.
	ki	Schmidt Péter
	hol	Komló (település)

Kulcsszavak

- kétszikűek
- védett faj