

Tárgyak:	Sárga selyemmályva - Abutilon theophrasti
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_2626

Leírás

Nagyjából egy méteresre megnövő, nyár közepétől őszig virágzó, veszélyes, invazív gyomnövény.

Őshazája valószínűleg Kína. Ott és Tibetben rost- és gyógynövényként is termesztették így került a Balkán-félszigetre, innen terjedt el Délkelet-, Közép- és Nyugat-Európába. A Balkánról Észak-Afrikán, majd Anglián keresztül jutott el a faj Észak-Amerikába és Ausztráliába is. Bár rostja erős és rugalmas, a XVIII. század közepére a jelentősebb rosnövények a köztermesztésből kiszorították, ám eddigre veszélyes gyomnövényé vált. Hazájában és azon kívül is gyümölcsösökben, szőlőben, szántóföldön, kertekben, utak szélén és egyéb bolygatott helyeken, ártereken fordul elő.

A hazánkba valószínűleg dísnövényként bekerült növényfaj a Bükk-től észak-keletre, a Zempléni-hegységben és Zalában vadult ki először. A Közép-Duna vidékén és a Tisza-mentén az 1920-as évekig csak szórványos előfordulású faj az 1960-as évekre megjelent Belső-Somogyban, a Mecsekalján, Budapest, Kalocsa és Baja környékén, valamint a Dráva-síkon és a Kisalföldön is.

A sárga selyemmályva valamennyi megyénkben előfordul, jelenleg leginkább a tiszai Alföldön, az Északi-középhegység előterében, a Zempléni-hegységben, a Dél- és Nyugat-Dunántúlon a legelterjedtebb. Sok helyen a gyomirtási technológia megválasztásában is meghatározó szerepet játszik. Legnagyobb borítással Tolna, Békés és Somogy megyében fordul elő.

Természetközeli élőhelyek közül ártéri magaskórósokban, zavart gyepekben fordul elő. Hazánkban szántóföldi gyomnövényként van nagyobb jelentősége.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méreték:

300 dpi, 2736 x 3648 pixel, jpg

Események

Felvétel	mikor	2016. augusztus 28.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Székesfehérvár

Kulcsszavak

- kétszikűek
- mályvafélék