

Tárgyak:	Piros árvacsalán színhiányos egyed
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_2715

Leírás

Magyarországon 6 árvacsalán-faj fordul elő, amelyek között van nagyon ritka és közönséges faj is. Általában virágaik színe alapján egyértelműen megkülönböztethetőek egymástól. Viszonylag gyakoriak az árvacsalánok között a színhiányos egyedek, amilyen a képen szereplő példány is.

A piros árvacsalán tipikus, úgynevezett efemer vagy rövid tenyészidejű faj. Olyan növényfajok tartoznak ezek közé, amelyek élethossza jóval rövidebb, mint egy vegetációs periódus, vagyis egy év. Csak pár hónapig, extrém esetben csak néhány hétig élnek, ezalatt kifejlődnek, virágoznak, termést érlelnek, elszórják magjaikat és elhalnak. Ökológiailag így használják ki a nekik különösen kedvező, de viszonylag rövid ideig tartó külső körülményeket. Például ilyen növények a sivatagban élő fajok nagy része, amelyek csak nagy esőzések után hajtanak ki, és csak pár hétig élnek. Magyarországon a legtöbb esetben az efemerek kora tavasszal, még a többi egyéves vagy évelő növényfaj előtt kibújnak és leélik kérészéletüket. Sok esetben mesterséges biotópokhoz, taposott gyepekhez, téglafalakhoz, kövezett járdafelszínekhez kötődnek, és szinte mindig hatalmas tömegben jelennek meg.

A piros árvacsalán is kora tavaszi faj. Különféle bolygatott gyepekben, kertekben, gyomtársulásokban, parlagokon, parkokban megtalálható. Az ország egész területén közönséges, a legtöbbször tömeges előfordulású faj. Az egyik legkorábban virágzó, nem hagymás vagy gyökérgumós lágyszárúnk.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

350 dpi, 3648 x 2736 pixel, jpg

Események

Felvétel készítése	mikor	2020. március 28.
	ki	Schmidt Péter
	hol	Kiskorpád

Kulcsszavak

- ajakosvirágúak
- kétszikűek