

Tárgyak:	Sárga dajkapók - Cheiracanthium mildei
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3124

Leírás

A dajkapókok mediterrán elterjedésű faja.

Mind a 12 hazánkban előforduló dajkapóknak erős szűrőszervük van, több faj könnyen átszűrja az emberi bőrt, ezzel fájdalmas marást képes okozni.

A sárga dajkapók közepesen gyakori faj, száraz, meleg gyepekben, réteken, szőlőkben, gyümölcsösökben, esetleg bokorerdőkben fordul elő. Ma már országszerte elterjedt faj, pár évtizede azonban még igen ritka volt, csak a déli országrészben élt. A klímaváltozás hatására északi irányban növelte elterjedését. Nőstényei által, pázsitfűvek virágzatába készített, jellegzetesen oldalra görbült lakószövedékeit agresszívan védi. Csípése fájdalmas tud lenni.

A sárga dajkapók a leggyakoribb házakban és lakásokban is előforduló dajkapók, amelyeket általában virágokkal, növényekkel hozunk a beltérbe.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méret:

350 dpi, 3648 x 2736 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2020. február 29.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Kaposvár-Kaposszentjakab

Kulcsszavak

- pókok