

	<b>Object:</b> Vízipásztor hímje - Orthetrum cancellatum
	<b>Museum:</b> Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
	<b>Collection:</b> RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
	<b>Inventory number:</b> RRM_TT_DF_3217

## Description

Magyarországon nagyjából 90 szitakötő-faj fordul elő. 2 fő csoportjuk a kis- és a nagyszitakötők. A nagyszitakötők közé tartozó laposacsák családjának 22 faja fordul elő hazánkban, ezek közé tartozik a pásztorszitakötők 4 faja is. Elégé hasonló fajok, de a megfelelő bélyegek vizsgálatával megkülönböztethetők egymástól. Közös jellemzőjük, hogy hímjeik kék, nőstényeik sárgásbarna színezetűek.

A vízipásztor (újabb magyar nevén feketefarkú pásztorszitakötő) a leggyakoribb a nemzetség 4 faja közül, de összességében is az egyik leggyakoribb nagyszitakötő Magyarországon. Főként álló-, néha lassan folyó vizekben fejlődik, még az erősebb szennyeződések és eutrofizációt is képes elviselni, kifejezetten tág tűrőképességű szitakötő.

## Basic data

Material/Technique:

Digitális

Measurements:

300 dpi, 1600 x 1200 pixel, jpg

## Events

Image taken	When	July 13, 2016
	Who	Schmidt Péter
	Where	Fenekpuszta

## Keywords

- Odonata

- egyenlőtlen szárnyú szitakötők