

| | |
|---------------|---|
| Tárgyak: | Vízipásztor hímje - Orthetrum cancellatum |
| Intézmény: | Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu |
| Gyűjtemények: | RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény |
| Leltári szám: | RRM_TT_DF_3217 |

Leírás

Magyarországon nagyjából 90 szitakötő-faj fordul elő. 2 fő csoportjuk a kis- és a nagyszitakötők. A nagyszitakötők közé tartozó laposacsák családjának 22 faja fordul elő hazánkban, ezek közé tartozik a pásztorszitakötők 4 faja is. Eléggé hasonló fajok, de a megfelelő bélyegek vizsgálatával megkülönböztethetők egymástól. Közös jellemzőjük, hogy hímjeik kék, nőstényeik sárgásbarna színezetűek.

A vízipásztor (újabb magyar nevén feketefarkú pásztorszitakötő) a leggyakoribb a nemzetség 4 faja közül, de összességében is az egyik leggyakoribb nagyszitakötő Magyarországon. Főként álló-, néha lassan folyó vizekben fejlődik, még az erősebb szennyeződések és eutrofizációt is képes elviselni, kifejezetten tág tűrőképességű szitakötő.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

300 dpi, 1600 x 1200 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2016. július 13.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Fenékpusztá

Kulcsszavak

- Szitakötők

- egyenlőtlen szárnyú szitakötők