

Tárgyak:	Bundásbogár - Epicometis hirta 2
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3260

Leírás

Magyarországon 15 virágbogár-faj fordul elő, amelyek igen változatosak színezetben és méretben is. Mindannyian nappal aktívak, többségük viráglátogató, de gyakran szívogatják fák kicsorgó nedveit is. Érdekességük, hogy kitines szárnyfedőik alakja miatt repülés közben azokat nem nyitják szét, hanem összecsukva tartják. Leggyakoribb fajuk a bundásbogár, amelyet sokszor tömegesen figyelhetünk meg erdőszegélyek, cserjések, mezsgyék, különféle dús növényzetű gyepek napsütötte részein, amint nagy méretű (elsősorban sárga és fehér színű) virágokon táplálkoznak. Dús szőrözöttségéről könnyen felismerhetjük ezt az 1 cm-t alig meghaladó rovarot. Az egyik legkorábban kifejlődő lemezescsápú bogár-faj, már márciusban megjelennek legelső egyedei. Országszerte elterjedt és nagyon gyakori faj.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

72 dpi, 3150 x 2280 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2012. március 31.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Kaposfüred

Kulcsszavak

- bogarak
- lemezescsápú bogarak