

Tárgyak:	Fehérgyűrűs bogáncscincér - Agapanthia villosviridescens 2
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3334

Leírás

A bogáncscincérek közepes méretű (legfeljebb 2-2,5 cm-es) és hosszú csápú cincérfajok. 9 hazánkban előforduló fajuk közül mindegyik viráglátogató, ezért a beporzásban jelentős szerepük van. A cincérek nagy részével ellentétben lágyszárú növényekben fejlődnek lárváik. Egyik leggyakoribb fajuk a fehérgyűrűs bogáncscincér, amely Magyarországon általánosan elterjedt, az alföldektől a hegyvidékekig sokfelé előfordul, főként virágokban gazdag gyepekben, magaskórósokban, egyéb nyílt biotópokban. Különbőféle lágyszárúakban - ernyősökben, bogáncs- és asztafélékben és egyéb fajokban - fejlődnek lárvái.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

350 dpi, 3648 x 2736 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2018. május 21.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Pamuk

Kulcsszavak

- bogarak
- cincérfélék