

	<p>Object: Fehérgyűrűs bogáncscincér - <i>Agapanthia villosoviridescens</i> 3</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Inventory number: RRM_TT_DF_3335</p>
--	--

Description

A bogáncscincérek közepes méretű (legfeljebb 2-2,5 cm-es) és hosszú csápú cincérfajok. 9 hazánkban előforduló fajuk közül mindegyik viráglátogató, ezért a beporzásban jelentős szerepük van. A cincérek nagy részével ellentétben lágyszárú növényekben fejlődnek lárváik. Egyik leggyakoribb fajuk a fehérgyűrűs bogáncscincér, amely Magyarországon általánosan elterjedt, a síkságoktól a hegyvidékekig sokfelé előfordul, főként virágokban gazdag gyepekben, magaskórósokban, egyéb nyílt biotópokban. Különféle lágyszárúakban - ernyősökben, bogáncs- és asztafélekben és egyéb fajokban - fejlődnek lárvái.

Basic data

Material/Technique:	Digitális
Measurements:	350 dpi, 3250 x 2280 pixel, jpg

Events

Image taken	When	May 14, 2020
	Who	Schmidt Péter
	Where	Sántos

Keywords

- Cerambycidae
- Coleoptera