

Tárgyak:	Gyapjaslepke nősténye petezés közben - Lymantria dispar
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3412

## Leírás

Az egyik legjelentősebb, nagylepkék közé tartozó kártevő fajunk. Tömeges elszaporodása (gradációja) általában 8-10 évente van, és olyankor hatalmas területeken rágják tarrá a tölgyféléket hernyói, jelentős erdőgazdasági kárt okozva. Ám nem csak ezek a tápnövényei: szinte minden őshonos lombosfának a leveleit is elfogyasztják lárváik. Imágói nyáron rajzanak, a nemek között jelentős ivari és életmódbeli dimorfizmus is megfigyelhető: a hímek barna mintázatúak, 3-4 cm-esek, nappal repülnek és szinte sosem szállnak le, míg a nőstények krémszínűek, 5-6 cm-esek és röpképtelenek. Országsszerte közönséges, különösen tölgyesekben és azok környékén mindenütt előfordul.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:	Digitális
Méretek:	350 dpi, 3648 x 2736 pixel, jpg

## Események

Felvétel	mikor	2018. július 21.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Simonfa

## Kulcsszavak

- éjjeli lepkék