

Tárgyak:	Bükkös irtása széltörött hagyásfával
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_4362

## Leírás

Bükkös irtása széltörött hagyásfával

Közép-Európa középhegységeire jellemző őshonos, állományalkotó fafaj a bükk. Magyarországon átlagosan 600 méteres magasság felett jelenik meg, de azonálisan ennél alacsonyabban, a dombvidékek északi, hűvösebb részein is állományalkotó, sőt néhány területen még síkvidéken is jelen van. Ezen utóbbiakat hidegkori maradványállományoknak tartják, ezért különleges értékeink.

Fája erdőgazdasági szempontból is kiemelten értékes. Mivel, hogy hegyvidéki, csapadékkedvelő faj, a felmelegedés és a kevesebb csapadék az ökológiai tűrőképességük határán álló állományokra jelentős negatív hatást gyakorol. Emiatt a dombvidékeink - különösen a Dél-dunántúli bükkösök - végveszélyben vannak. A korábbi évszázadokhoz képest jelentősen kevesebb csapadék miatt nem csak egyszerűen elszáradnak, sokszor a legyengült fák elveszítik szilárdságukat és a (szintén egyre gyakoribb és erősebb) szélviharok miatt félbetörnek.

A bükk, azon túl, hogy az egyik legszebb és legértékesebb európai őshonos erdőtípus állományalkotója, számos gerinctelen állatfaj egyedüli tápnövénye is, mindemellett jó néhány gerinces faj is van, amely kifejezetten a bükkös erdőkhöz kötődik.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

350 dpi, 4896 x 3672 pixel, jpg

## Események

Felvétel mikor 2022. október 17.

készítése

ki Schmidt Péter  
hol Cserénfa

## Kulcsszavak

- Tájak, élőhelyek