

	<p>Object: Bundásbogár - Tropinota hirta</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Inventory number: RRM_TT_DF_4586</p>
--	---

Description

Magyarországon 15 virágbogár-faj fordul elő, amelyek igen változatosak színezetben és méretben is. Mindannyian nappal aktívak, többségük viráglátogató, de gyakran szívogatják fák kicsorgó nedveit is. Érdekességük, hogy kitines szárnyfedőik alakja miatt repülés közben azokat nem nyitják szét, hanem összecsukva tartják. Leggyakoribb fajuk a bundásbogár, amelyet sokszor tömegesen figyelhetünk meg erdőszegélyek, cserjések, mezsgyék, különféle dús növényzetű gyepek napsütötte részein, amint nagy méretű virágokon táplálkoznak. Dús szőrözöttségéről könnyen felismerhetjük ezt az 1 cm-t alig meghaladó rovar. Az egyik legkorábban kifejlődő lemezescsápú bogár-faj, már márciusban megjelennek legelső egyedei. Országszerte elterjedt és nagyon gyakori faj.

Basic data

Material/Technique:	Digitális
Measurements:	350 dpi, 4896 x 3672 pixel, jpg

Events

Image taken	When	April 14, 2022
	Who	Schmidt Péter
	Where	Mezőcsokonya-Csombárdi-rét

Keywords

- Coleoptera
- lemezescsápú bogarak