

Tárgyak:	Bundásbogár - Tropinota hirta
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_4586

Leírás

Magyarországon 15 virágbogár-faj fordul elő, amelyek igen változatosak színezetben és méretben is. Mindannyian nappal aktívak, többségük viráglátogató, de gyakran szívogatják fák kicsorgó nedveit is. Érdekességük, hogy kitines szárnyfedőik alakja miatt repülés közben azokat nem nyitják szét, hanem összecsukva tartják. Leggyakoribb fajuk a bundásbogár, amelyet sokszor tömegesen figyelhetünk meg erdőszegélyek, cserjések, mezsgyék, különféle dús növényzetű gyepek napsütötte részein, amint nagy méretű virágokon táplálkoznak. Dús szőrözöttségéről könnyen felismerhetjük ezt az 1 cm-t alig meghaladó rovar. Az egyik legkorábban kifejlődő lemezescsapú bogár-faj, már márciusban megjelennek legelső egyedei. Országszerte elterjedt és nagyon gyakori faj.

Alapadatok

Anyag/ Technika:	Digitális
Méretetek:	350 dpi, 4896 x 3672 pixel, jpg

Események

Felvétel	mikor	2022. április 14.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Mezőcsokonya-Csombárdi-rét

Kulcsszavak

- bogarak
- lemezescsapú bogarak