

Tárgyak:	Aranyló bábormoly - Pyrausta aurata
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_4618

Leírás

A fűgyökérrágó-molyok közé tartozó bábormolyoknak 14 hazánkban is előforduló faja van. Nevüket a legtöbb fajra jellemző bíboros-pirosas-arany-sárga színezetükről kapták, egy részük azonban fekete-fehér mintázatú. Egyik leggyakoribb ezek közül az aranyló bábormoly, mely meglehetősen hasonlít egy másik gyakori, nemzetségbeli tagra, a közönséges bábormolyra, amely valamivel nagyobb. 2 generációja május-június és augusztus-szeptember folyamán repül. Országszerte elterjedt, és gyakori lepke.

Alapadatok

Anyag/ Technika:	Digitális
Méret:	350 dpi, 3648 x 2736 pixel, jpg

Események

Felvétel	mikor	2022. május 08.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Fiad

Kulcsszavak

- molylepkék - Microlepidoptera