

	<b>Object:</b> Réti bíbormoly - <i>Pyrausta despicata</i>
	<b>Museum:</b> Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
	<b>Collection:</b> RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
	<b>Inventory number:</b> RRM_TT_DF_4620

## Description

A fűgyökérrágó-molyok közé tartozó bíbormolyoknak 14 hazánkban is előforduló faja van. Nevüket a legtöbb fajra jellemző bíboros-pirosas-arany-sárga színezetükről kapták, egy részük azonban fekete-fehér mintázatú. Leggyakoribb közülük a réti bíbormoly, mely az egyetlen barnás-szürkés színezetű faja a nemzetségnek. 2 generációja május-június és augusztus-szeptember folyamán repül. Országszerte elterjedt, és igen gyakori lepke, de kötődik a nyílt, legfeljebb cserjés területekhez, azonban ezen belül nem válogatós: a természetes löszgyepektől a felhagyott legelőkön át egészen a szántóföldi mezsgyéig, parlagokig megtalálható.

## Basic data

Material/Technique:	Digitális
Measurements:	350 dpi, 4124 x 2954 pixel, jpg

## Events

Image taken	When	May 5, 2022
	Who	Schmidt Péter
	Where	Patalom

## Keywords

- molylepkék - Microlepidoptera