

Tárgyak:	Réti bíbormoly - <i>Pyrausta despicata</i>
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_4620

Leírás

A fűgyökérrágó-molyok közé tartozó bíbormolyoknak 14 hazánkban is előforduló faja van. Nevüket a legtöbb fajra jellemző bíboros-pirosas-arany-sárga színezetükről kapták, egy részük azonban fekete-fehér mintázatú. Leggyakoribb közülük a réti bíbormoly, mely az egyetlen barnás-szürkés színezetű faja a nemzetségnek. 2 generációja május-június és augusztus-szeptember folyamán repül. Országszerte elterjedt, és igen gyakori lepke, de kötődik a nyílt, legfeljebb cserjés területekhez, azonban ezen belül nem válogatós: a természetes löszgyepektől a felhagyott legelőkön át egészen a szántóföldi mezsgyéig, parlagokig megtalálható.

Alapadatok

Anyag/ Technika:	Digitális
Méretek:	350 dpi, 4124 x 2954 pixel, jpg

Események

Felvétel	mikor	2022. május 05.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Patalom

Kulcsszavak

- molylepkek - Microlepidoptera