

Tárgyak:	Foltos sárgabagoly - <i>Xanthia gilvago</i>
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_4653

## Leírás

A hazánkban előforduló 4 *Xanthia*-bagolylepkefaj mindegyike egymáshoz igen hasonló, sárga alapszínű, sötét foltos rovar. Mindnyájan nyár végén - ősz elején repülnek, többségüknek nyár- és fűz-fajok jelentik hernyóik fő tápnövényeit. Az elég gyakori szürkés sárgabagolytól (*Xanthia ocellaris*) az igen ritka lilás sárgabagolyig (*Xanthia togata*) más-más gyakoriságúak. A foltos sárgabagoly összességében szórványosnak mondható melegkedvelő faj, nálunk száraz dombsági és hegyvidéki erdőkben fordul elő, ahol még nagy mennyiségben élnek szilfák, hernyóinak ugyanis ez a fő tápnövénye.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

350 dpi, 3648 x 2736 pixel, jpg

## Események

Felvétel mikor 2022. október 02.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Somogysárd

## Kulcsszavak

- bagolylepkefélék
- éjjeli lepkék