

Tárgyak:	Ezüstkék boglárka aberráció - Polyommatus coridon
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_4707

## Leírás

Nevéhez híven hímjei ezüstkék színűek ennek a közepes méretű és közepes gyakoriságú boglárkalepkének. Kötődik bizonyos területekhez és élőhelyekhez: meszes talajú száraz gyepekben, pusztafüves lejtőkön, sziklagyepekben, valamint homoki gyepekben fordul elő; főként középhegységeinkben, de ritkábban domb- és síkvidéken is. Egyéb élőhelyeken nem jellemző, de az előbb említett megfelelő biotópokban igen gyakori, sőt domináns, tömeges is lehet. Egy nemzedéke nyár elejétől ősz elejéig repül. Jellemző tápnövényei a gyakoribb gyepi pillangós lágyszárúak.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

350 dpi, 2832 x 2316 pixel, jpg

## Események

Felvétel mikor 2022. augusztus 06.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Ausztria

## Kulcsszavak

- boglárkalepke-félék
- nappali lepkék