

	<p>Tárgyak: Bogáncslepke - <i>Vanessa cardui</i></p> <p>Intézmény: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Gyűjtemények: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: RRM_TT_DF_4722</p>
--	--

Leírás

A tarkalepkék (Nymphalidae) közé tartozó, középnagy méretű lepkefaj elmosódott, rejtőszínű szárnyfonákjával, és tarka szárnyfelszínével, de különösképpen repülési sebességével és manőverezési képességével tűnik ki fajtársai közül. Kozmopolita fajnak tekinthető, hiszen Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Amerika nagy részét leszámítva az egész világon elterjedt. Alapvetően melegkedvelő lepkefaj, és csak a nagyszerű repülési és ebből adódóan vándorlási képességének köszönhető, hogy majdnem az egész Földön előfordul. Magyarországon is mindenhol találkozhatunk vele, áprilistól egészen novemberig, azonban a teleket nem éli túl semmilyen formában (pete, hernyó, báb). Igazi vándorfaj, amelynek az első április-májusi nemzedéke afrikai és dél-európai területekről jut el hazánkba, majd ezeknek az utódai fejlődnek ki, és alkotják az azévi későbbi nemzedékeket. A tavaszi, bevándorolt példányokon érdekes megfigyelni, hogy honnan érkezhettek hozzánk: minél kopottabbak, valószínűleg annál távolabb keltek ki, a legkopottabbak és legjobban ronszolódottak akár több ezer kilométer távolságból, minden bizonnyal a Szaharától délre levő területekről jutottak el hazánkba. A zártabb helyeket kerüli, inkább a meleg, napsütötte területeket kedveli: a legkülönbélebb nyílt élőhelyeken előfordul a természetes gyepektől a mezőgazdasági területeken át (ahol szója-, napraforgó- és cukorrépa-kártevő is lehet) a virágokban gazdag városi parkokig. Általánosságban véve csak közepesen gyakori fajnak számít nálunk, de gyakorisága kizárólag a tavasszal felvándorolt példányoktól függ, ezért nem veszélyeztetett. A melegedő éghajlat kedvez a fajnak (például 2019-ben szinte tömeges és a leggyakoribb nappali lepke volt Magyarországon és egész Európában), azonban a bevándorlási területeken kitenyésző állományok nagysága nagymértékben függ a tavaszi időjárási szélsőségektől. Így egy kedvezőtlen tavaszi periódus erősen meggyérítheti az adott évi hazai állományokat. Fő tápnövénye aszat- (*Cirsium* sp.), bogáncs- (*Carduus* sp.) és csalán-fajok (*Urtica* sp.).

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méreték:

350 dpi, 4896 x 3672 pixel, jpg

Események

Felvétel	mikor	2022. május 26.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Polány

Kulcsszavak

- nappali lepkék
- tarkalepkefélék