

	<p>Object: Bundásbogár - Tropinota hirta (1)</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Inventory number: RRM_TT_DF_5121</p>
--	---

Description

Magyarországon 15 virágbogár-faj fordul elő, amelyek igen változatosak színezetben és méretben is. Mindannyian nappal aktívak, többségük viráglátogató, de gyakran szívogatják fák kicsorgó nedveit is. Érdekességük, hogy kitines szárnyfedők alakja miatt repülés közben azokat nem nyitják szét, hanem összecukva tartják. Leggyakoribb fajuk a bundásbogár, amelyet sokszor tömegesen figyelhetünk meg erdőszegélyek, cserjések, mezsgyék, különféle dús növényzetű gyepek napsütötte részein, amint nagy méretű virágokon táplálkoznak. Dús szőrözöttségéről könnyen felismerhetjük ezt az 1 cm-t alig meghaladó rovarat. Az egyik legkorábban kifejlődő lemezescsápú bogár-faj, már márciusban megjelennek legelső egyedei. Országszerte elterjedt és nagyon gyakori faj.

Basic data

Material/Technique:	Digitális
Measurements:	180 dpi, 3712 x 2784 pixel, jpg

Events

Image taken	When	March 26, 2023
	Who	Schmidt Péter
	Where	Somogyzil

Keywords

- Coleoptera
- lemezescsápú bogarak