

Tárgyak:	Kék nünüke - <i>Meloe violaceus</i>
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_5145

Leírás

Hazánkban 14 nünüke-faj fordul elő, melyeket nem könnyű megkülönböztetni egymástól. A nünükék és rokonaik teste kantharidin nevű mérget termel, amely keserű ízű a rovarevők számára. Bár gyakran látjuk őket, különösen tavasszal, csak 2-3 fajuk számít gyakorinak, többségük elég ritka. A 2. leggyakoribb közülük a kék nünüke, amely tavasz végén rajzik. Országszerte elterjedt, sokféle gyakori, de a közönséges fajtársával ellentétben a nyílt, gyeses területeket kevésbé kedveli, inkább a ligetes, ritkás erdőket, cserjés-bokros területeket. Méretben megegyezik vele, de valamivel később, inkább áprilisban a leggyakoribb, míg a közönséges nünüke már márciusban.

Alapadatok

Anyag/ Technika: Digitális
Méretek: 180 dpi, 2356 x 1892 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2023. április 28.
készítése
ki Schmidt Péter
hol Polány

Kulcsszavak

- bogarak