

Tárgyak:	Csőröslepke - <i>Libythea celtis</i> (2)
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_5293

Leírás

A csőröslepkék alcsaládjának az egyetlen Európában előforduló faja. Nincs más Magyarországon előforduló hasonló faj, legjellegzetesebb jegyei a felső szárny sarkának baltaszerű nyúlványa, valamint a fej hosszúra kinyúló ajaktapogatói – amelyről a magyar nevét is kapta. Latin nevében viszont egyetlen tápnövénye, a nyugati ostorfa (*Celtis occidentalis*) latin megfelelője köszön vissza. Vándorlepke, amely eredetileg mediterrán területeken, Dél-Európában, Kis-Ázsiában volt elterjedt, majd az ostorfa parkfaként való alkalmazása és telepítése – majd későbbi kivadulása - miatt délnyugati irányból folyamatosan benépesítette mára az egész Kárpát-medencét, annak ellenére, hogy első alkalommal csak 1945-ben észlelték hazánkban. Elsősorban sík- és dombvidékeken gyakoribb, de sokszor városi parkokban egész nagy állományai jelenhetnek meg. Tápnövényének terjedése és a melegedő éghajlat kedvez a faj egyre északabbra való előrenyomulásának. A kifejlett lepkék júniustól kelnek ki a bábokból, és egészen októberig találkozhatunk velük. Ezt követően a nyár végén kifejlődő példányok fagytól mentes menedékhelyekre húzódnak, és áttelelnak. Ezekkel az egyedekkel gyakran találkozhatunk a következő tavasz igen korai melegebb napjain. Rendszertelenül az egész országban előfordulhat, de nem tartozik a gyakori fajok közé, ezért védett, természetvédelmi értéke 5 000 forint.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

180 dpi, 3294 x 2433 pixel, jpg

Események

Felvétel
készítése

mikor

2023. március 18.

ki Schmidt Péter
hol Gamás

Kulcsszavak

- nappali lepkék
- tarkalepkefélék
- védett faj